

FARMACODEPENDENCIA Y SU RELACION PSIQUIATRICA ASOCIADA EN PACIENTES QUE CONSULTARON LA CLINICA STELLA MARIS DE CUCUTA EN EL AÑO 2013 Y SU SITUACION ACTUAL EN EL AÑO 2021

Laura Valentina Parrado Moreno

INTRODUCCIÓN

Los trastornos por uso de sustancias son un reto para la salud pública en general y para la psiquiatría en particular. Desde hace un buen tiempo estos trastornos se presentan con características epidémicas, afectando a una gran parte de la población sin señales de que se vayan a erradicar. Los resultados de estudios epidemiológicos sugieren que mientras la prevalencia de consumo de algunas drogas, como el tabaco, está disminuyendo en la población general, la prevalencia de consumo de otras sustancias, como la marihuana y el uso indebido de medicamentos de prescripción, está aumentando dramáticamente.

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuáles son los trastornos psiquiátricos más frecuentes relacionados con la farmacodependencia en pacientes de la clínica Stella Maris de Cúcuta en el año 2013 y cuál es su situación actual para el año 2021.

METODOLOGÍA

El enfoque de investigación toma el modelo del paradigma positivista cuantitativo, implica entonces asumir que se direcciona la investigación hacia la descripción de ciertos factores que pueden ser medidos y evidenciar la interacción entre variables.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS


El sexo más predispuesto a padecerlo es el masculino con 88%, dejando un 12% restante que corresponde al sexo femenino.

De los 283 pacientes incluidos, 150 se encuentran en el rango de 21 años a 30 años, donde se encuentra el mayor riesgo de padecer el síndrome.

Se identificó que el uso de múltiples drogas y uso de diferentes sustancias psicoactivas corresponde a un 47% de los pacientes en estudio, siendo ellos los que presentan mayor riesgo de caer en un síndrome dependiente, seguido de un 25% para los opiáceos y 14% para sustancias cannabinoideas.


El síndrome de dependencia en su mayoría se acompaña de otros trastornos psiquiátricos, en los pacientes estudiados el 36% está diagnosticado con trastorno depresivo, un 18% no tiene ninguna patología psiquiátrica y un 13% sufre de parasomnia, seguido de un trastorno de ansiedad generalizado en 10% de los pacientes, siendo esos los más relevantes.

Grafica 1. Distribución de pacientes por sexo




Etiquetas de fila	Cuenta de rango edad
10 - 20	8
21 - 30	150
31 - 40	71
41 - 50	25
51 - 60	13
61-70	8
71 - 80	1
71-80	6
81-90	1
Total general	283

Grafica 2. SUSTANCIAS USADAS



Grafica 4. ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS



CONCLUSIONES

La mayor cantidad de pacientes estudiados presentan dependencia a múltiples sustancias psicoactivas; conociendo y registrando los datos anteriormente especificados se puede lograr enfocar esfuerzos en la población vulnerable a presentar este síndrome, realizar un seguimiento más cercano e individualizado de acuerdo con las razones de su dependencia, permitiendo así tener un buen y eficaz registro de este síndrome, comprendiendo que las áreas cuya atención es requerida es la no adherencia al tratamiento y las razones de la misma.

REFERENCIAS

- MARTINEZ F. Farmacodependencia: Conceptos, Consecuencias y Tratamiento [Internet]. Liferder [citado el 25 de abril de 2019]. Disponible en: <https://www.liferder.com/farmacodependencia/>
- Alteraciones psiquiátricas producidas por fármacos [Internet]. Institut català de farmacologia. 1987 [citado el 25 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.icf.uab.cat/assets/pdf/productes/bg/es/bg12.87_e.pdf